

Tunja, Febrero 17 de 2013.

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR AUMENTO DE CASOS DE PAROTIDITIS

La Secretaría de Salud de Boyacá se permite informar que hasta la semana epidemiológica 6 de 2014 (08 de febrero de 2014) al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), se han notificado un total de 55 casos de Parotiditis en el departamento de Boyacá, de los cuales el 54,54% (30 casos) son procedentes del municipio de Santa Rosa de Viterbo - Escuela de Policía Rafael Reyes-, el 10,90% (6 casos) en Belén, el 9,09% (5 casos) en Boavita, el 5,45% (3 casos) en Tunja, el 5,45% (3 casos) en Sogamoso y con un (1) caso los municipios de Aquitania, Gámeza, Motavita, Nobsa, Paipa, Pesca, Samacá y Santana. Los casos notificados, 44 son hombres (80%) y 11 son mujeres (20%) con un rango de edad entre 1 y 58 años.

La parotiditis es una enfermedad vírica aguda que se caracteriza por fiebre, aumento de volumen y dolor al tacto de una o más de las glándulas salivales, por lo regular la parótida, y a veces las sublinguales o las submaxilares. En un tercio de las infecciones, no se presenta aumento aparente de las glándulas salivales.

La definición operativa de caso para efectos de la vigilancia "es aquel paciente con cuadro clínico agudo caracterizado por fiebre, cefalea, vómito, edema e inflamación unilateral o bilateral de las glándulas parótidas o salivales, de duración igual o mayor a dos días, sin otra causa aparente". Se transmite por vía aérea y contacto directo con la saliva de una persona infectada, tiene un período de incubación de 16 a 18 días, con un rango entre 14 a 25 días y el período de transmisibilidad va desde 7 días antes hasta 9 días después del inicio de la parotiditis.

Teniendo en cuenta que la parotiditis ingresa al sistema de vigilancia epidemiológica como confirmado por clínica, es posible que se estén notificando cuadros clínicos con cuadro parecido, sin que sean necesariamente cuadros causados por el virus de la parotiditis. Lo anterior hace necesario fortalecer la vigilancia del evento, mejorando la especificidad del sistema de vigilancia.

Por lo anterior, se recuerdan las siguientes recomendaciones generales para la prevención y control del evento:

1. Aislamiento de todos los casos confirmados hasta 9 días después de inicio de la parotiditis.

2. Suministrar información a todos los contactos de los casos sobre la enfermedad y la importancia de la consulta en caso de síntomas.
3. Se alerta a los municipios contiguos para que evalúen todos los casos probables e inicien las medidas de control.
4. Notificar oportunamente todos los casos confirmados por clínica al software SIVIGILA.
5. Evitar el contacto de personas menores de 10 años con pacientes sintomáticos o confirmados clínicamente.
6. Identificación de nuevos casos a través de una búsqueda activa de los contactos del caso índice y de los susceptibles.

Cordialmente,



GUILLERMO ORJUELA ROBAYO
Secretario de salud Boyacá



Revisó: **CLARA SONIA GUERRERO BERNAL**
Directora Técnica de Salud Pública

Elisa Jimena González C
Elaboró: Elisa Jimena González Castañeda. Referente VSP