Bajo peso al nacer a término (BPNT)

Departamento de Boyacá, II periodo epidemiológico de 2020

153 casos,
Aumento del 42% en relación al dato del II periodo del 2019




48%


52%



Incidencias


- **General 5,5%**
- **< 15 años 20%**
- **Adolescentes 4,7%**






Otros 100%


Etnia













Subsidiado 59%
Contributivo 34%
No asegurado 11%
Especial 4%
Excepción 3%

Gobernación de Boyacá | Secretaría de Salud | Boyacá Avanza

Desnutrición aguda en menores de 5 años,

Departamento de Boyacá, III periodo epidemiológico de 2020



Total

• 106

Niñas

• 46%






Niños

• 54%



Incidencia 114,7 DNT aguda * 100.000 menores de 5 años



Clasificación Peso

- DNT aguda Severa: 24%
- DNT aguda Moderada: 76%

Clasificación Talla

- Adecuada:46%
- Riesgo T. Baja: 29%
- Talla Baja: 25%

Signos clínicos

- Edema 0,9%
- Delgadez 55,7%
- Piel reseca 17,9%
- Hiperpigmentación 7,5%
- Cambios cabello 13,2%
- Palidez 13,2%



Edad

<1 año: 43%

1 año: 25%

2 años 16%

3 años: 9%

4 años: 6%




Área Residencia

Cabecera: 32%

Centro poblado: 9%

Rural: 59%



Etnia:

Otros: 97%

Indígena: 3%



Régimen Seguridad

Subsidiado 82%

Contributivo 13%

No asegurado 4%