


DEFECTOS CONGENITOS PERIODO EPIDEMIOLOGICO I, BOYACA 2021

INDICADORES

- Prevalencia de DC al nacer * **197,4**
- Proporción de casos de hipotiroidismo congénito con ajuste **0%**
- Prevalencia de hipotiroidismo congénito en menores de un año* **0,0**
- Tasa de mortalidad por defectos congénitos **0,1%**

*Tasa de prevalencia por 10 000 NV

Comportamiento de las anomalias congénitas, Boyaca 2019-2021



Masculino

40,9%
10/18



Femenino

39,6%
6/18

Indeterminado


19,5%
2/18

Variable	Categoría	Casos	%
Tipo de régimen	Contributivo	2	11,1
	Subsidiado	13	72,2
	Especial	0	0,0
Grupos de edad madres	No afiliado	3	16,7
	10 a 14 años	0	0,0
	15 a 19 años	3	16,7
	20 a 24 años	4	22,2
	25 a 29 años	3	16,7
	30 a 34 años	4	22,2
	35 a 39 años	4	22,2
40 y más años	0	0,0	


Prevalencia por grupos de defectos congénitos

Grupo de Malformaciones congénitas	Frecuencia	Prevalencia por 10000 NV
Sistema circulatorio (Q20-Q28)	10	109,6
Sistema osteomuscular (Q65-Q79)	2	21,9
Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte (Q90-Q99)	0	0,0
Sistema nervioso (Q00-Q09)	2	21,9
Fisura del paladar y labio leporino (Q35-Q38)	1	11,0
Sistema urinario (Q60-Q64)	2	21,9
Ojo, del oído de la cara y del cuello (Q10-Q18)	0	0,0
Sistema digestivo (Q39-Q45)	0	0,0
Organos genitales (Q50-Q56)	1	11,0
Sistema respiratorio (Q30-Q34)	0	0,0
Otras malformaciones congénitas (Q80-Q89)	0	0,0

Malformaciones congénitas mas frecuentes



Georreferenciación



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 2020